中国莲叶桐科植物志资料

李 雅 茹
(中国科学院昆明植物研究所)

MATERIAE AD FLORAM HERNANDIACEARUM SINICARUM

Li Ya-ru
(*Institutum Botanicum Kunmingense Academia Sinicae*)

Hernandiaceae

2 Illigera

1. **圆叶青藤** 新种 图1:1

Illigera orbiculata C. Y. Wu, sp. nov.

Species affinis *I. trifoliatae* (Griff.) Dunn, sed fructibus majoribus 7—9 cm. in diametro, foliolis orbicularibus differt.

本种近似三叶青藤 I. trifoliata (Griff.) Dunn. 但果较小,直径 7—9 厘米,小叶圆形而不同。

云南: 勐宽至勐崙途中, 水边林中, 1961 年 3 月 8 日, 李延辉 02973 (模式 Typus! HK[1])

4b. **小果青藤** 新变种

Illigera grandiflora W. W. Sm. et J. F. Jeff. var. **microcarpa** C. Y. Wu, var. nov.

A var. *grandiflora* recedit fructibus minoribus c. 4—5.5 cm. in diametro.

与原变种大花青藤 var. glandiflora 干果较小,直径约 4—5.5 厘米。

云南: 景东, 落水洞, 海拔 2100 米, 1939 年 12 月 6 日, 李鸣岗 2254 (模式 Typus! HK); 盈江至瑞丽, 秦仁昌 50255; 腾冲, 陈介 1045; 盈江, 陶国达 13080; 新平,武素功 602。

4c. **柔毛青藤** 新变种

Illigera grandiflora W. W. Sm. et J. F. Jeff. var. **pubescens** Y. R. Li, var. nov.

A var. *grandiflora* recedit foliolis subtus densius pubescentibus.

与原变种大花青藤 var. glandiflora 不同在于小叶下面密被柔毛。

云南: 景东,三卡村, 海拔 1680 米, 1939 年 10 月 18 日,李鸣岗 684 (模式 Typus!);

1) HK=Herb. Inst. bot. Kunming. Acad. Sin., Kunming. (中国科学院昆明植物研究所)。

勐养，攸落山，李延辉 3321。

图 1 1.**圆叶青藤 Illigera orbiculata** C. Y. Wu 1.果枝。 2—4.**短蕊青藤 I. brevistaminata** Y. R. Li 2.花枝； 3.花纵剖(放大)； 4.雄蕊放大。 (肖熔绘)

图 2 1-3.**无毛青藤 Illigera glabra** Y. R. Li 1.花枝； 2.花放大； 3.雄蕊放大。 4-6.**尾叶青藤 I. pseudoparviflora** Y. R. Li 4.花枝； 5.花纵剖； 6.雄蕊。 7.**狭叶青藤 I. rhodantha** Hance var. **angustifoliolata** Y. R. Li 7.花枝。

5c. **狭叶青藤** 新变种 图 2:7

Illigera rhodantha Hance var. **angustifoliolata** Y. R. Li, var. nov.

A var. *rhodantha* recedit foliolis angustioribus 6—9 cm. longis, 2—3 cm. latis.

与原变种红花青藤 var. rhodantha 不同在于小叶较狭，长 6—9 厘米，宽 2—3 厘米。

广东：高要，山顶旷野石上，1932 年 10 月 10 日，梁向日 61834 (模式 Typus! HK)

5d. **圆翅青藤** 新变种

Illigera rhodantha Hance var. **orbiculata** Y. R. Li, var. nov.

A var. *rhodantha* recedit fructibus minoribus 4—5 cm. in diametro, aliis orbiculatis.

与原变种红花青藤 var. rhodantha 不同在于果较小，直径 4—5 厘米，翅为圆形。

广东：高州，高凉岭，密林中，1929 年 5 月 10 日，蒋英 2229 (模式 Typus! HC[1])

9. **无毛青藤** 新种 图 2:1—3

1) HC Herb. Inst. Bot. Austro-Sin., Acad. Sin. Canton. (中国科学院华南植物研究所)。

Illigera glabra　Y. R. Li, sp. nov.

Species affinis *I. parviflorae* Dunn, sed inflorescentiis glabris minoribus c. 5 cm. longis, sepalis ovato-ellipticis 3.5—4 mm. longis c. 2.5 mm. latis glandulis hyalinis dense ornatis, petalis oblongis 2—2.5 mm. longis 1—1.5 mm. latis, staminibus subsessilibus 1—1.5 mm. longis differt.

本种和小花青藤 I. parviflorae Dunn 相似；但花序平滑无毛，较小，长约 5 厘米；萼片卵状椭圆形，长 3.5—4 毫米，宽约 2.5 毫米；雄蕊近无花丝，长 1—1.5 毫米而不同。

云南：沧源，下斑老龙头山，密林中，1974 年 6 月15日，李延辉 12000（模式 Typus!）；同地，下斑老龙头山至班高途中，海拔 680—750 米，李延辉 12323。

13. **尾叶青藤**　新种　图 2:4—6

Illigera pseudoparviflora　Y. R. Li, sp. nov.

Species affinis *I. parviflorae* Dunn, sed inflorescentiis robustioribus pilis luteo-fuscis dense obtectis, staminibus petalis brevioribus c. 4.5—5 mm. longis in alabastris erectis differt.

本种近似小花青藤 I. parviflora Dunn；但花序较粗壮，密被黄褐色短柔毛；雄蕊较花瓣为短，长 4.5—5 毫米，在花芽中直立而有所不同。

贵州：罗甸，疏林中，1965 年 5 月 15 日，贵州植物园标本室 518（模式 Typus! HK）。

14. **短蕊青藤**　新种　图 1:2—4

Illigera brevistaminata　Y. R. Li, sp. nov.

Species affinis *I. pseudoparviflorae* Y. R. Li, sed foliolis subcoriaceis, longe ellipticibus vel ovato-ellipticibus vel late lanceolatis 6—9 cm. longis 3—4 cm. latis basi rotundis vel subrotundis, staminibus c. 2 mm. longis filamentis brevissimis differt.

本种与尾叶青藤 I. pseudoparviflora Y. R. Li 相似；但小叶为近革质，长椭圆形或卵状椭圆形或阔披针形，长 6—9 厘米，宽 3—4 厘米，基部圆形至亚圆形；雄蕊长约 2 毫米，花丝极短而不同。

贵州：南部与广西交界处，空旷地，海拔 330 米，1930 年 9 月 24 日，蒋英 7200（模式 Typus! HHK[1]）。

湖南：宜章，海拔 100 米，山谷疏林石上，陈少卿 1984。

1) HHK=Herb. Hort. Kweichow., Kweiyang.（贵州植物园）。